




힘이되는 평생친구, 보건복지부

국립인천검역소



1339

수신 수신자 참조


(경유)

제목 해외감염병 발생 정보 제공

1. 평소 검역업무 협조에 감사드리며, 귀 기관(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 최근 싱가포르 지카바이러스 감염증, 일본 오사카 간사이공항 홍역 집단 감염 발병, 국내 네 번째 콜레라 환자 발생에 따라 해외감염병 발생 및 질병 정보와 예방수칙을 붙임과 같이 제공하오니 감염병 예방 홍보 업무에 참고하시기 바랍니다.
3. 또한, 입국 시 발열, 발진, 기침, 콧물, 설사 등 의심증상이 있으면 검역관에게 신고하고, 귀국 후 3주 이내에 의심증상 발생 시 질병관리본부 콜센터(국번없이 1339)에 신고하거나 의료기관을 방문하여 해외 여행력을 알리고 진료 받을 수 있도록 귀 기관(사)의 홈페이지 및 게시판, 모니터(전광판) 등을 통해 적극적으로 홍보하여 주시기 바랍니다.


· 해외감염병 발생정보 : 질병관리본부 홈페이지(www.odc.go.kr) 및 해외여행질병정보센터(travelinfo.odc.go.kr)

붙임 1. 해외감염병 발생 정보 제공 1부. 끝.



2016. 09. 06

국립인천검역소장



수신자 국기정보원인천항만분실장, 인천출입국관리사무소장, 인천지방경찰청장, 인천세관장, 인천지원장, 인천광역시청, 인천중부경찰서장, 경인지방식품의약품안전청(농수산물안전과장), 농림축산검역본부 송부지역본부장, 인천해양경비안전서장, 인천광역시 소방안전본부장, 인천광역시 송구청장(보건행정과장), 인천군보건소장, 인천형민공사시장, 인천광역시의료원장, 인하대학교병원장, 인천항보안공사시장 (사) 인천항여객터미널 사장, 한국선주협회 인천지회장, 인천항 도선사회장, 인천관광협회회장, (주)인도, 웨리 인천사무소장, (주)대인웨리 인천사무소장, (주)범영웨리 인천사무소장, (주)연운광웨리 인천사무소장, (주)위동향운 인천사무소장, (주)신인해운 인천사무소장, (주)신천향운 인천사무소장, (주)인송웨리 인천사무소장, (주)화동웨리 인천사무소장, 유니프로스 인천사무소장, 뮐헨스협운(주), 협상해운(주), 한신여객사, 국제1여객터미널 관광안내소, 국제2여객터미널 관광안내소

검역관 안념임 검역관 신용용 검역과장 노희원 국립인천검역소장 이순이

협조자

시행 검역과-1618 (2016. 9. 6.) 접수

우 22346 인천광역시 중구 시해대로 365 (항동7가) 국립인천검역소 / [http //](http://)

전화번호 032-883-7503 팩스번호 032-891-1251 / namia99@korea.kr / 대 국민 공개

위험할 땐 119 힘겨울 땐 120

해외감염병 발생 정보 제공

○ 지카바이러스 감염증

- (싱가포르) 주가 확진환자 91명*(38명(9.2), 26명(9.3), 27명(9.4)) 발생 보고
- * 기존 Aljunied Crescent, Sims Drive, Kallang Way, Paya Lebar Way 클러스터(83명), 신규 Joo Seng Road area 클러스터 (2명), 클러스터 분명(6명)
- * '16년 싱가포르 자국내 감염사례(누적): 41건(8.28) → 151건(9.1) → 242건(9.4)
- (말레이시아) '16년 최초 자국 내 발생 사례 보고(9.3)
- * Sabah 거주 61세 남성, 해외 여행력 없음, 8.27 증상발현, 8.31 확진(혈액, 소변 전체 양성), 기저질환(관상동맥성 심장질환) 악화로 사망(9.3)

○ A형간염

- (미국) 7개주에서 70명* 확진환자 발생 보고(9.1)
- 이집트 수입 냉동팽귤을 사용한 스무디 식당제인(Tropical Smoothie Cafe) 에서 발생
- * 버지니아(55), 테네시(6), 웨스트버지니아(5), 노스캐롤라이나(1), 위스콘신(1), 뉴멕시코(1), 오리건(1)
- * 해당 회사는 매진의 500개 이상의 제안에서 자발적으로 팔기 회수

○ 홍역

- (일본) 8.17일부터 오사카의 간사이공항에서 홍역이 발생하여 공항직원 26명이 감염

○ 콜레라

- (대한민국) 9.3일 네 번째 콜레라 확진 환자 발생(남, 47세)
- 필리핀 여행력 있음(8.21~8.28)

홍역 질병정보

1. 개요

홍역은 제2군 법정 감염병으로 전 세계적으로 유행하는 급성 발진성 바이러스 질환이며, 백신의 개발 이후 선진국에서는 발생이 현저히 줄었으나 개발도상국가에서는 아직도 흔히 발생하며, 특히 소아에서 생명을 위협하는 주요한 질병임

2. 원인

- 원인병원체: 홍역바이러스(Measles Virus)
- 감염경로
 - 홍역 환자의 호흡기 분비물 등의 비말에 의하거나 오염된 물건을 통하여 호흡기로 감염
 - 홍역 바이러스는 태반을 통과하기 때문에 태아가 감염되어 선천성 홍역을 일으킬 수도 있음
 - 홍역은 온대 지방에서 늦은 겨울부터 봄에 가장 많이 발생하며, 전염력이 강하여 감수성 있는 사람이 노출되었을 때 90%이상에서 감염됨

3. 증상

- (증상) 특징적인 증상은 고열과 기침, 콧물, 결막염, 구강 점막에 Koplik 반점에 이은 특징적인 홍반성 구진상 발진
- (합병증) 설사, 중이염, 기관지염, 모세기관지염, 크룹, 기관지 폐렴 등
- (잠복기) 10~12일
- 발진 발생 4일 전부터 발진 발생 4일 후까지 홍역의 전파가 가능하며, 전구기 발생 시점부터 발진 발생 후 4일까지 가장 전염력이 높은 것으로 알려져 있음

4. 치료

- 보존적 치료(안정, 충분한 수분 공급 등), 대증치료(해열제 등)

5. 예방

• 예방접종

- 접종대상 : 모든 영유아
- 접종시기 : MMR 백신을 생후 12~15개월, 만 4~6세에 접종
- 접종용량 및 방법 : 상완외측면에 0.5ml 피하주사
- 홍역유행시기에는 생후 6~11개월에 MMR 백신 가속 접종
- '67년 이후 출생자로 홍역 면역력의 증가가 없는 경우 유행지역으로의 해외이행 전 MMR 백신 접종 권고

콜레라 예방수칙

1. 30초 이상 올바른 손씻기
2. 물은 끓여먹기
3. 음식은 익혀먹기
4. 하루 수차례 수양성 설사 증상이 발생한 경우 즉시 의료기관 방문하여 진료 받기

콜레라 등 수인성감염병 예방수칙 3가지

콜레라는 개인위생을 철저하게 하면 예방 가능합니다

